

► Cabinet d'orthodontie du Dr Céline ROLOFF

Orthodontiste à Trets

📍 164 Route de Saint-Maximin 13530 TRET

☎ Tel. : +33 4 42 61 33 15

🌐 dr-celine-roloff.chirurgiens-dentistes.fr

La chirurgie orthognatique

La chirurgie orthognatique permet de corriger certains déséquilibres entre les mâchoires qui ne relèvent pas du seul traitement orthodontique.

POUR QUELS TYPES DE PROBLÈMES ?

- Mauvaise occlusion dentaire (engrènement entre les dents).
- Difficultés de mastication, respiration, élocution.
- Déséquilibre du visage : anomalies de forme ou de volume du menton (trop en avant ou trop en arrière/fuyant), lèvre supérieure trop en arrière, suites d'accident...

Avant tout traitement, un bilan très complet sera effectué ainsi que différentes radiographies et empreintes dentaires. L'occlusion dentaire sera évaluée. Les différentes fonctions étudiées. L'impact esthétique analysé.

L'intervention peut concerner l'une des mâchoires ou bien les deux.

Une fois la nécessité de l'intervention décidée, l'orthodontiste et le chirurgien maxillo-facial prépareront le plan de traitement.



Bien que chaque cas soit différent, le traitement se déroule habituellement en 3 étapes :

► Traitement orthodontique pré-opératoire

> L'orthodontiste intervient avant l'opération afin de préparer au mieux la future position des dents.

> D'une durée de 12 à 18 mois environ, le traitement s'effectue à l'aide d'appareils orthodontiques.

► Phase chirurgicale

À l'issue de cette phase de préparation, le chirurgien effectue l'intervention sous anesthésie générale afin de corriger la position des mâchoires. Aucune cicatrice ne sera visible.

► Traitement orthodontique post-chirurgical

> Ce traitement permet de compléter les corrections effectuées, d'améliorer le bon ajustement des arcades dentaires et d'optimiser l'occlusion.

> Prévoir environ 6 mois.

À SAVOIR

Avant la décision d'intervention, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous préoccupent, qu'elles soient personnelles (modification de l'apparence du visage), esthétiques (résultats attendus et limites), pratiques (hospitalisation, arrêt de travail...).

Votre chirurgien vous expliquera aussi les suites opératoires à prévoir, le type d'alimentation et les précautions nécessaires pendant les jours et semaines qui suivront l'opération.